



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية



الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي التجاري

الشعبة: تقني رياضي

دورة: 2021

ثانوية مرسى الحجاج (وهران)

إعداد: الأستاذ قوعيش

تصحيح اختبار مادة: الرياضيات

الموضوع الأول

التمرين الأول : (04 نقاط)

(1) نعتبر في \mathbb{Z}^2 المعادلة (E) ذات المجهول ($x; y$) التالية : $31 = 2011x - 1432y \dots$

(أ) بين أن العدد 2011 أولي .

لدينا $\sqrt{2011} \approx 44,8$ والعدد 2011 لا يقبل القسمة على أي عدد أولي من بين الأعداد الأولية الأصغر من 44

ب) باستعمال خوارزمية إقليدس عين حلًا خاصا ($x_0; y_0$) للمعادلة (E) ، ثم حل في \mathbb{Z}^2 المعادلة (E).

لدينا :

$$579 = 2011 - 1 \times 1432$$

$$274 = 1432 - 2 \times 579$$

$$31 = 579 - 2 \times 274$$

$$\begin{cases} 31 = 579 - 2 \times (1432 - 2 \times 579) \\ = -2 \times 1432 + 5 \times 579 \\ = -2 \times 1432 + 5 \times (2011 - 1 \times 1432) \\ = 5 \times 2011 - 7 \times 1432 \end{cases}$$

ومنه :

$$(x_0; y_0) = (5; 7)$$

$$\begin{cases} 2011x - 1432y = 31 \\ 2011x_0 - 1432y_0 = 31 \end{cases}$$

لدينا : بالطرح نجد : $2011(x - x_0) = 1432(y - y_0)$ أي :
 $2011(x - 5) = 1432(y - 7)$

لدينا $2011/x - 1432/5$ أولي مع 2011 إذن حسب مبرهنة غوص $x/5$

ومنه $x = 2011k + 5$ حيث $k \in \mathbb{Z}$ ، وبالتعويض في المعادلة (E) نجد : $y = 2011k + 7$

ومنه : $(x; y) = (1432k + 5; 2011k + 7)$ حيث $k \in \mathbb{Z}$

(2) أ) عين حسب قيم العدد الطبيعي n باقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 7 ، ثم جد باقي القسمة الإقليدية للعدد $2011^{1432^{2012}}$ على 7 .

لدينا : $2^3 \equiv 1[7]$ ، $2^2 \equiv 4[7]$ ، $2^1 \equiv 2[7]$ ، $2^0 \equiv 1[7]$ ومنه الباقي دوري ودورها 3 إذن من أجل كل عدد طبيعي

. $2^{3k+2} \equiv 4[7]$ ، $2^{3k+1} \equiv 2[7]$ ، $2^{3k} \equiv 1[7]$:

لدينا $2011^{1432^{2012}} \equiv 2^{1432^{2012}} [7]$ ومنه $2011 \equiv 2[7]$

من جهة أخرى $[3]$ ومنه $1432^{2012} \equiv 1^{2012}$ أي $1432^{2012} \equiv 1^{2012} [3]$ حيث $1432 = 3k' + 1$ و $1432^{2012} \equiv 1^{2012}$ ومنه $k' \in \mathbb{N}$ إذن $2^{1432^{2012}} \equiv 2^{2011^{1432^{2012}}} \equiv 2^7$ على 7 هو . 2

ب) عين قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون : $2010^n + 2011^n + 1432^n \equiv 0 [7]$.

$$2010 \equiv 1 [7] \Leftrightarrow 2010^n \equiv 1^n [7] \Leftrightarrow 2010^n \equiv 1 [7]$$

$$2011 \equiv 2 [7] \Leftrightarrow 2011^n \equiv 2^n [7]$$

$$1432 \equiv 4 [7] \Leftrightarrow 1432^n \equiv 2^{2n} [7]$$

ومنه $[7]$ إذن : $2010^n + 2011^n + 1432^n \equiv 1 + 2^n + 2^{2n} [7]$

$$2010^n + 2011^n + 1432^n \equiv 0 [7] \Leftrightarrow 1 + 2^n + 2^{2n} \equiv 0 [7]$$

$$\Leftrightarrow 2^n + 2^{2n} \equiv -1 [7]$$

$$\Leftrightarrow 2^n + 2^{2n} \equiv 6 [7]$$

ليكن $k \in \mathbb{N}$

من أجل $2^n + 2^{2n} = 2^{3k} + 2^{3(2k)} \equiv 2 [7]$: $n = 3k$

من أجل $2^n + 2^{2n} = 2^{3k+1} + 2^{2(3k+1)} = 2^{3k+1} + 2^{3(2k)+2} \equiv 6 [7]$: $n = 3k+1$

من أجل $2^n + 2^{2n} = 2^{3k+2} + 2^{2(3k+2)} = 2^{3k+2} + 2^{3(2k+1)+1} \equiv 6 [7]$: $n = 3k+2$

إذن قيم n هي : $n = 3k+1$ أو $n = 3k+2$ حيث $k \in \mathbb{N}$

(3) عدد طبيعي يكتب $\overline{2\gamma\alpha\beta}$ في نظام التعداد ذي الأساس 9 حيث α, β, γ و تشكل حدودا متتابعة بهذا الترتيب لمتالية حسابية متزايدة تماما و الثانية $(\beta; \gamma)$ حل للمعادلة (E) .

أ) عين α, β و γ .

$$\begin{cases} 0 \leq \alpha < 9 \\ 0 \leq \beta < 9 \\ 0 \leq \gamma < 9 \end{cases} \text{ مع الشرط : } N = \overline{2\gamma\alpha\beta}^9 = \beta + \alpha \times 9 + \gamma \times 9^2 + 2 \times 9^3 = \beta + 9\alpha + 81\gamma + 54$$

الثانية $(\gamma; \beta)$ حل للمعادلة (E) معناه يوجد $k \in \mathbb{Z}$ بحيث : $\beta = 1432k + 5$ و $7 = 2011k + 7$

$$0 \leq \beta < 9 \Leftrightarrow 0 \leq 1432k + 5 < 9 \Leftrightarrow -\frac{5}{1432} \leq k < \frac{4}{1432} \Leftrightarrow -0,0035 \leq k < 0,0028$$

وبما أن $k \in \mathbb{Z}$ فإن $k = 0$ بالتعويض نجد $\beta = 5$ و $\gamma = 7$.

α, β, γ و تشكل حدودا متتابعة بهذا الترتيب لمتالية حسابية متزايدة تماما معناه $2\beta = \alpha + \gamma$ ومنه $\alpha = 2\beta - \gamma = 3$

ب) أكتب N في النظام العشري .

$$N = \beta + 9\alpha + 81\gamma + 54 = 2057$$


التمرين الثاني : (05 نقاط)

يحوي كيس على أربع كريات حمراء تحمل الرقم α و ثلاثة كريات خضراء تحمل الرقم $1-\alpha$ و كريتين ببيضاوين تحملان الرقم 1 ، حيث α عدد طبيعي غير معدوم . الكريات متماثلة ولا تميز بينها عند اللمس . نسحب عشوائيا من الكيس ثلاثة كريات في آن واحد .

نعتبر الحوادث التالية : A " الحصول على كرية بيضاء على الأكثر " ، B " الحصول على ثلاثة كريات تحمل نفس العدد " و C " الحصول على كريتين بالضبط تحملان الرقم $1-\alpha$ " .

(1) أ) أحسب إحتمال كل من الحوادث A ، B و C .

" A الحصول على كرية بيضاء على الأكثر" نميز حالتين :



سحب 3 كريات من بينها واحدة بيضاء سحب 3 كريات ولا توجد من بينها أي كرية بيضاء .

$$P(A) = \frac{C_2^1 \times C_7^2 + C_7^3}{C_9^3} = \frac{11}{12}$$

" B الحصول على ثلاثة كريات تحمل نفس العدد"

نميز حالتين :

سحب 3 كريات لها نفس الرقم α .

سحب 3 كريات لها نفس الرقم $\alpha - 1$.

$$P(B) = \frac{C_4^3 + C_3^3}{C_9^3} = \frac{5}{84}$$

" C الحصول على كريتين بالضبط تحملان الرقم $\alpha - 1$

معناه سحب 3 كريات من بينها كريتين تحملان الرقم $\alpha - 1$ أما الكرية الثالثة تحمل إما الرقم 1 أو الرقم α

$$P(C) = \frac{C_3^2 \times C_6^1}{C_9^3} = \frac{3}{14}$$

ب) ما هو احتمال الحصول على ثلاثة كريات تحمل ألوان العلم الوطني ؟

معناه سحب 3 كريات من 3 ألوان مختلفة مثنى مثنى ومنه :

$$P(D) = \frac{C_3^1 \times C_2^1 \times C_4^1}{C_9^3} = \frac{2}{7}$$

(2) ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب مجموع الأرقام الظاهرة على الكريات الحمراء المسحوبة والذي يأخذ القيمة 0 إذا لم يتم سحب أي كرية حمراء .

أ) بره أن القيم الممكنة لـ X هي $\{0, \alpha, 2\alpha, 3\alpha\}$ ثم عرف قانون احتماله .

إذا لم يتم سحب أي كرية حمراء فإن $X = 0$

إذا سحبنا كرية حمراء واحدة فإن $X = \alpha$

إذا سحبنا كريتين حمراوين فإن $X = \alpha + \alpha = 2\alpha$

إذا كانت كل الكريات الثلاث حمراء فإن $X = \alpha + \alpha + \alpha = 3\alpha$

$$\text{ومنه } X \in \{0, \alpha, 2\alpha, 3\alpha\}$$

$$P(X = 0) = \frac{C_5^3}{C_9^3} = \frac{10}{84}$$

$$P(X = \alpha) = \frac{C_4^1 \times C_5^2}{C_9^3} = \frac{40}{84}$$

$$P(X = 2\alpha) = \frac{C_4^2 \times C_5^1}{C_9^3} = \frac{30}{84}$$

$$P(X = 3\alpha) = \frac{C_4^3}{C_9^3} = \frac{4}{84}$$

$X = X_i$	0	α	2α	3α
$P(X = X_i)$	$\frac{10}{84}$	$\frac{40}{84}$	$\frac{30}{84}$	$\frac{4}{84}$

ب) أحسب بدلالة α الأمل الرياضي $E(X)$ للمتغير العشوائي X ، ثم عين قيمة α من أجل

$$\cdot |E(X) - 1| \leq 2$$

$$E(X) = 0 \times \frac{10}{84} + \alpha \times \frac{40}{84} + 2\alpha \times \frac{30}{84} + 3\alpha \times \frac{4}{84} = \frac{4}{3}\alpha$$

$$|E(X) - 1| \leq 2 \Leftrightarrow -2 \leq E(X) - 1 \leq 2 \Leftrightarrow -1 \leq E(X) \leq 3 \Leftrightarrow -1 \leq \frac{4}{3}\alpha \leq 3 \Leftrightarrow -\frac{3}{4} \leq \alpha \leq \frac{9}{4} \Leftrightarrow -0,75 \leq \alpha \leq 1,25$$

بما أن α عدد طبيعي غير معادم فإن $\alpha \in \{1; 2\}$

التمرين الثالث : (04 نقاط)

نعتبر المتالية العددية (u_n) المعرفة بحدها الأول $u_1 = -2$ ، و من أجل كل عدد طبيعي غير معادم n :

$$\cdot u_{n+1} = \frac{3(n+1)u_n - (8n+12)}{n}$$

. (1) برهن بالترابع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معادم n : $u_n < 0$

من أجل $n=1$ لدينا $u_1 = -2 < 0$ ومنه الخاصية صحيحة من أجل $n=1$.

نفرض أن $u_n < 0$ و نبرهن أن $u_{n+1} < 0$.

لدينا $u_n < 0 \Leftrightarrow 3(n+1)u_n < 0$ لأن $3(n+1) > 0$

$\forall n \in \mathbb{N}^*, 3(n+1)u_n < 0 \Leftrightarrow -3(n+1)u_n > 0$ وكذلك $-3(n+1)u_n > 8n+12$

بالجمع نجد $3(n+1)u_n - (8n+12) < 0$ وبما أن $3(n+1)u_n - (8n+12) < 0$ فإن $u_{n+1} < 0$ وبما أن $n > 0$ إذن $u_{n+1} < 0$.

إذن الخاصية صحيحة من أجل $n+1$. ومنه من أجل كل عدد طبيعي غير معادم n :

ب) أثبت أن المتالية (u_n) متناقصة تماما.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3(n+1)u_n - (8n+12)}{n} - u_n = \frac{3(n+1)u_n - (8n+12) - nu_n}{n} = \frac{(2n+3)(u_n - 4)}{n}$$

بما أنه $u_n < 0$ فإن $u_n - 4 < 0$ وبما أن $2n+3 > 0$ و $n > 0$ إذن $u_{n+1} - u_n < 0$

ومنه $\frac{(2n+3)(u_n - 4)}{n} < 0$ إذن (u_n) متناقصة تماما.

. (2) لتكن المتالية العددية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي غير معادم n كما يلي :

أ) بين أن المتالية (v_n) هندسية أساسها 3 يطلب تعين حدتها الأول ، ثم عبر عن v_n بدلالة u_n .

$$v_n = \frac{4 - u_n}{n}$$

$$v_{n+1} = \frac{4 - u_{n+1}}{n} = \frac{4 - \frac{3(n+1)u_n - (8n+12)}{n}}{n} = \frac{4n - 3(n+1)u_n + 8n + 12}{n(n+1)} = \frac{-3(n+1)u_n + 12(n+1)}{n(n+1)}$$

$$\text{ومنه } v_{n+1} = \frac{-3u_n + 12}{n} = 3 \left(\frac{4 - u_n}{n} \right) = 3v_n$$

حدتها الأول : $v_1 = 6$

. أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معروف n فإن : $u_n = 4 - 2n \times 3^n$ ثم أحسب

$$\text{لدينا } v_n = v_1 \times q^{n-1} = 6 \times 3^{n-1} = 2 \times 3^n \text{ ومن جهة أخرى لدينا :}$$

$$v_n = \frac{4 - u_n}{n} \Leftrightarrow 4 - u_n = nv_n \Leftrightarrow u_n = 4 - nv_n = 4 - 2n \times 3^n$$

. لاحظ أن (u_n) متبااعدة . $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 4 - 2n \times 3^n = -\infty$ $\begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} 3^n = +\infty \end{cases}$

. $P_n = (4 - u_1)(4 - u_2) \dots (4 - u_n)$ الجداء :

$$\text{لدينا } \forall n \in \mathbb{N}^*, nv_n = 4 - u_n \text{ ومنه :}$$

$$P_n = (4 - u_1)(4 - u_2) \dots (4 - u_n) = (1 \times v_1)(2 \times v_2) \dots (n \times v_n) = (1 \times 2 \times \dots \times n)(v_1 \times v_2 \times \dots \times v_n)$$

نعلم أن : $1 \times 2 \times \dots \times n = n!$

$$v_1 \times v_2 \times \dots \times v_n = 2 \cdot 3^1 \times 2 \cdot 3^2 \times \dots \times 2 \cdot 3^n = 2^n \cdot 3^{1+2+\dots+n} = 2^n \cdot 3^{\frac{n(n+1)}{2}}$$

$$P_n = n! \cdot 2^n \cdot 3^{\frac{n(n+1)}{2}} \text{ ومنه}$$

. $w_n = \ln \left(\frac{n}{4 - u_n} \right)$: لتكن المتالية العددية (w_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي غير معروف n كما يلي :

. $S_n = w_1 + w_2 + \dots + w_n$ ثم أحسب بدلالة n المجموع :

$$w_n = \ln \left(\frac{n}{4 - u_n} \right) = \ln \frac{1}{v_n} = -\ln(2 \cdot 3^n)$$

$$S_n = w_1 + w_2 + \dots + w_n = -\ln(2 \cdot 3^1) - \ln(2 \cdot 3^2) - \dots - \ln(2 \cdot 3^n) = -\ln(2 \cdot 3^1 \times 2 \cdot 3^2 \times \dots \times 2 \cdot 3^n) = -\ln \left(2^n \cdot 3^{\frac{n(n+1)}{2}} \right)$$

التمرين الرابع : (07 نقاط)

(I) نعتبر الدالة العددية g المعرفة على المجموعة \mathbb{R} كما يلي :

. أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{e^2} xe^x + \frac{2}{e^2} e^x - 2 = -2 \quad \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty \quad \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x + 2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x-2} = +\infty \end{cases}$$

(2) أدرس إتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها .

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^{x-2} > 0 \text{ لأن } e^{x-2} > 0 \text{ لـ } g'(x) = (x+3)e^{x-2}$$

ومنه الدالة g متناظرة تماما على المجال $[-3; +\infty]$ ومتزايدة تماما على المجال $[+3; +\infty]$

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$g'(x)$	-	○	+
$g(x)$	-2	$-\frac{1}{e^5} - 2$	$+\infty$

(3) أ) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا في \mathbb{R} ، ثم تحقق من أن $1,45 < \alpha < 1,46$. الدالة g لا تتعدم على المجال $[-3; +\infty]$ لأن $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -2 < 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ بينما الدالة g مستمرة ورتيبة تماماً على المجال $[-3; +\infty]$ ولدينا $g(-3) < 0$ و $g(+\infty) = +\infty$ إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا في المجال $[1,45; 1,46]$. لدينا $0 < 1,45 \times 1,46 \approx -0,0095 \times 0,0163$ ومنه $\alpha \in [1,45; 1,46]$.
ب) استنتج إشارة $g(x)$ تبعاً لقيمة العدد الحقيقي x .

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$g(x)$	-	○	+

(II) f هي الدالة المعرفة على \mathbb{R} كما يلي : $f(x) = x^2 - x^2 e^{x-2}$.
نسمى $(O; i; j)$ التمثيل البياني للدالة f في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتاها $0 < 2$.
ومنه حلول المعادلة هي $\{0; 2\}$ ونستنتج أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتاها $0 < 2$.
أ) حل في \mathbb{R} المعادلة $f(x) = 0$.
 $f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2(1 - e^{x-2}) = 0 \Leftrightarrow x^2 = 0 \text{ ou } 1 - e^{x-2} = 0$
 $x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$
 $1 - e^{x-2} = 0 \Leftrightarrow e^{x-2} = 1 \Leftrightarrow x = 2$

ومنه حلول المعادلة هي $\{0; 2\}$ ونستنتج أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتاها $0 < 2$.
أ) حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 - \frac{1}{e^2} x^2 e^x = +\infty$ $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x = 0 \end{cases}$
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2(1 - e^{x-2}) = -\infty$ $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x-2} = +\infty \end{cases}$

(3) أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي $f'(x) = -x \cdot g(x)$: x هي الدالة المشتقة الأولى للدالة f .
 $f'(x) = 2x(1 - e^{x-2}) + x^2(-e^{x-2}) = x(2 - 2e^{x-2} - xe^{x-2}) = -x(xe^{x-2} + 2e^{x-2} - 2) = -x[(x+2)e^{x-2} - 2] = -xg(x)$

ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها .
إشارات $(x)g(x)$ من إشارة الجداء $(x)f'(x)$

x	$-\infty$	0	α	$+\infty$
$-x$	+	●	-	-
$g(x)$	-	-	●	+
$f'(x)$	-	●	+	●

الدالة f متناقصة تماما على المجالين $[-\infty; 0]$ و $[\alpha; +\infty)$ و متزايدة تماما على المجال $[0; \alpha]$.
جدول التغيرات :

x	$-\infty$	0	α	$+\infty$
$f'(x)$	-	●	+	●
$f(x)$	$+\infty$	0	$f(\alpha)$	$-\infty$

ج) بين أن $f(\alpha) = \frac{\alpha^3}{\alpha+2}$ ، ثم أعط حصرا $f(\alpha)$ حيث α هو العدد الحقيقي المعرف في الجزء I .

$$g(\alpha) = 0 \Leftrightarrow (\alpha+2)e^{\alpha-2} - 2 = 0 \Leftrightarrow e^{\alpha-2} = \frac{2}{\alpha+2}$$

$$f(\alpha) = \alpha^2 - \alpha^2 e^{\alpha-2} = \alpha^2 - \alpha^2 \cdot \frac{2}{\alpha+2} = \frac{\alpha^3}{\alpha+2}$$

$$1,45 < \alpha < 1,46 \Leftrightarrow 3,45 < \alpha+2 < 3,46 \Leftrightarrow \frac{1}{3,46} < \frac{1}{\alpha+2} < \frac{1}{3,45}$$

$$1,45 < \alpha < 1,46 \Leftrightarrow 3,0486 < \alpha^3 < 3,1121$$

$$\text{ومنه } 0,8811 < f(\alpha) < 0,9021 \text{ أي } \frac{3,0486}{3,46} < \frac{\alpha^3}{\alpha+2} < \frac{3,1121}{3,45}$$

أ) ليكن (Γ) المنحنى الممثل للدالة $x \mapsto x^2$ على \mathbb{R} .
بين أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - x^2] = 0$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - x^2] = \lim_{x \rightarrow -\infty} -x^2 e^{x-2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{1}{e^2} x^2 e^x = 0$$

ب) أدرس الوضعيّة النسبية للمنحنين (C_f) و (Γ) .


يكفي دراسة إشارة الفرق $f(x) - x^2$ أي $e^{x-2} - x^2$. وبما أن $e^{x-2} > 0 \forall x \in \mathbb{R}$ فإن إشارة $e^{x-2} - x^2$ من إشارة $-x^2$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$-x^2$	-	○	-
الوضعيّة النسبية	(Γ) تحت (C_f)	تقاطع	(Γ) تحت (C_f)

٥) عين معادلة لكل من المماسين (T) و (T') عند نقطتين ذات الفاصلتين ٢ و ٢- على الترتيب .

$$(T'): y = -4x - 4\left(1 + \frac{1}{e^4}\right) , (T): y = -4x + 8$$

. (٦) أنشيء (C_f) ، (Γ) ، (T') و (T)



٧) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي الموجب تماما m عدد حلول المعادلة : $f(x) = -4x + \ln(m)$

يكفي مناقشة عدد نقط تقاطع المنحني (C_f) مع المستقيم (d_m) :

الذي يوازي كلا من (T) و (T') ومنه :

من أجل $m < e^{-4\left(1+\frac{1}{e^4}\right)}$ أي $\ln(m) < -4\left(1 + \frac{1}{e^4}\right)$ المعادلة تقبل حلاً وحيداً في \mathbb{R} .

من أجل $m = e^{-4\left(1+\frac{1}{e^4}\right)}$ أي $\ln(m) = -4\left(1 + \frac{1}{e^4}\right)$ المعادلة تقبل حلاً مضاعفاً وحلاً بسيطاً.

من أجل $e^{-4\left(1+\frac{1}{e^4}\right)} < m < e^8$ أي $-4\left(1 + \frac{1}{e^4}\right) < \ln(m) < 8$ المعادلة تقبل ٣ حلول بسيطة.


من أجل $m = e^8$ أي $\ln(m) = 8$ المعادلة تقبل حلاً مضاعفاً وحلاً بسيطاً.

من أجل $m > e^8$ أي $\ln(m) > 8$ المعادلة تقبل حلاً وحيداً في \mathbb{R} .

انتهى تصحيح الموضوع الأول

التمرين الأول : (50 نقاط)

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $[0; +\infty]$ بـ :



(1) تتمثلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم

المتعامد و المتجانس $(\vec{O}; \vec{i}; \vec{j})$ ، (الشكل المقابل).

(2) بين أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0; +\infty]$

من البيان الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0; +\infty]$

لدينا كذلك : $f'(x) = \frac{e^{1/2}}{2\sqrt{x}}$ ومن أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[0; +\infty]$ إذن $f'(x) > 0$: f متزايدة تماما على المجال $[0; +\infty]$.

(2) لتكن المتالية (u_n) المعرفة على \mathbb{N}^* بـ :

أ) أنقل المنحني المقابل ثم مثل الحدود الأربع الأولى للمتالية (u_n) على حامل محور الفواصل (دون

حسابها) موضحا خطوط الإنشاء.

أنظر الشكل المقابل.

(ب) أعط تخمينا حول اتجاه تغير المتالية (u_n) و تقاربها .

لدينا من البيان $u_4 > u_3 > u_2 > u_1$ و منه (u_n) متتناقصة تماما .

النقط M_1 ، M_2 ، M_3 و M_4 من المنحني (C_f) ذات الفواصل u_1 ، u_2 ، u_3 و u_4 على الترتيب تتقارب

نحو نقطة ثابتة A هي نقطة تقاطع المنحني (C_f) مع المستقيم ذي المعادلة $y = x$ و منه (u_n) متقاربة نحو فاصلة النقطة A .

(3) برهن بالترابع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n ، $u_n > \frac{1}{e}$

من أجل $n=1$ لدينا $u_1 = e^2 > \frac{1}{e}$ و منه الخاصية صحيحة من أجل 1

نفرض أن $u_n > \frac{1}{e}$ و نبرهن أن $u_{n+1} > \frac{1}{e}$

$$u_{n+1} = e^{-\frac{1}{2}} \sqrt{u_n} = \frac{1}{\sqrt{e}} \sqrt{u_n}$$

$n+1$ و منه الخاصية صحيحة من أجل $u_n > \frac{1}{e} \Leftrightarrow \sqrt{u_n} > \sqrt{\frac{1}{e}} \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{e}} \sqrt{u_n} > \frac{1}{\sqrt{e}} \Leftrightarrow u_{n+1} > \frac{1}{e}$

إذن من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n ، $u_n > \frac{1}{e}$ و نستنتج أن (u_n) محدودة من الأسفل .

(4) أدرس اتجاه تغير المتالية (u_n) .

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{\sqrt{e}} \sqrt{u_n} - u_n = \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{e}} \sqrt{u_n}\right)^2 - u_n^2}{\frac{1}{\sqrt{e}} \sqrt{u_n} + u_n} = \frac{u_n \left(\frac{1}{e} - u_n\right)}{\frac{1}{\sqrt{e}} \sqrt{u_n} + u_n}$$

بما أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n ، فإن $u_n > \frac{1}{e}$ إذن $\sqrt{u_n} > 0$ ومنه $u_n > \frac{1}{e}$

ذلك من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n ، ومنه $\frac{1}{e} - u_n < 0$ إذن $u_n \left(\frac{1}{e} - u_n \right) < 0$ ومنه $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} - u_n < 0$ متناقصة تماما .
ب) ببر تقارب المتالية (u_n) ثم أوجد نهايتها .

بما أن (u_n) محدودة من الأسفل ومتناقصة تماما فهي متقاربة ، لإيجاد نهايتها نحل المعادلة $f(x) = x$

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n > 0 \text{ وبما أنه } x = \frac{1}{e} \text{ أو } x = 0 \text{ ومنه } f(x) = x \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{e}} \sqrt{x} = x \Leftrightarrow \frac{1}{e} x = x^2 \Leftrightarrow x \left(\frac{1}{e} - x \right) = 0$$

$$\text{فإن } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{e} \text{ ومنه } x = \frac{1}{e}$$

. $v_n = \frac{1}{2} + \ln \sqrt{u_n}$: \mathbb{N}^* بـ : نعتبر المتالية (v_n) المعرفة على

أ) برهن أن (v_n) متالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ ، يطلب تعين حدتها الأول .

$$v_{n+1} = \frac{1}{2} + \ln \sqrt{u_{n+1}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln u_{n+1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln \left(e^{-\frac{1}{2}} \sqrt{u_n} \right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(\ln e^{-\frac{1}{2}} + \ln \sqrt{u_n} \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \ln \sqrt{u_n}$$

$$\cdot \frac{1}{2} \text{ ومنه } v_{n+1} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \ln \sqrt{u_n} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \ln \sqrt{u_n} \right) = \frac{1}{2} v_n$$

$$\text{حدتها الأول : } v_1 = \frac{1}{2} + \ln \sqrt{u_1} = \frac{1}{2} + \ln \sqrt{e^2} = \frac{3}{2}$$

ب) أكتب عبارتي v_n و u_n بدلالة n ثم أحسب

$$v_n = v_1 \cdot q^{n-1} = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} = 3 \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

$$v_n = \frac{1}{2} + \ln \sqrt{u_n} \Leftrightarrow \ln \sqrt{u_n} = v_n - \frac{1}{2} \Leftrightarrow u_n = \left(e^{v_n - \frac{1}{2}} \right)^2 = e^{2v_n - 1} = e^{6 \left(\frac{1}{2} \right)^n - 1}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{6 \left(\frac{1}{2} \right)^n - 1} = \frac{1}{e} \begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^n = 0 \\ -1 < \frac{1}{2} < 1 \end{cases}$$

. $S_n = \frac{1}{1 + \ln u_1} + \frac{1}{1 + \ln u_2} + \dots + \frac{1}{1 + \ln u_n}$: \mathbb{N} أحسب بدلالة n المجموع التالي :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, 1 + \ln u_n = 6 \left(\frac{1}{2} \right)^n \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{1 + \ln u_n} = \frac{2^n}{6} \text{ ومنه } \forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = e^{6 \left(\frac{1}{2} \right)^n - 1}$$

$$S_n = \frac{1}{1 + \ln u_1} + \frac{1}{1 + \ln u_2} + \dots + \frac{1}{1 + \ln u_n} = \frac{2^1}{6} + \frac{2^2}{6} + \dots + \frac{2^n}{6} = \frac{1}{6} (2^1 + 2^2 + \dots + 2^n) = \frac{1}{6} \cdot 2 \left(\frac{2^n - 1}{2 - 1} \right)$$

$$\text{إذن : } S_n = \frac{1}{3} (2^n - 1) \text{ ومنه}$$

التمرين الثاني : (04) نقاط

أ) أنشر العبارة $(n+2)(3n^2 - 6n + 16)$ مع $n \in \mathbb{N}$

$$(n+2)(3n^2 - 6n + 16) = 3n^3 + 4n + 32$$

ب) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، يكون العدد $3n^3 + 4n + 32$ قابلاً للقسمة على 2 بما أن $n+2 / 3n^3 + 4n + 32 = (n+2)k$ حيث $k \in \mathbb{Z}$ و $k = 3n^2 - 6n + 16$

(2) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $3n^2 - 6n + 16$ هو عدد طبيعي غير معروف . لدينا $3n^2 - 6n + 16 > 0$ ومنه $\Delta = -156 < 0$ وبما أن $\forall n \in \mathbb{N}, 3n^2 - 6n + 16 \in \mathbb{Z}$ فإن $3n^2 - 6n + 16$ عدد طبيعي غير معروف .

(3) أ) بين أنه من أجل كل الأعداد الطبيعية غير المعروفة α ، β و γ ، تكون المساواة التالية صحيحة :

$$PGCD(\alpha; \beta) = PGCD(\beta\gamma - \alpha; \beta)$$

$$PGCD(\beta\gamma - \alpha; \beta) = d' \text{ و } PGCD(\alpha; \beta) = d$$

$$\text{لدينا } d / \beta\gamma - \alpha \text{ ومنه } \begin{cases} d / \alpha \\ d / \beta\gamma \end{cases} \text{ بالطرح نجد } \begin{cases} d / \alpha \\ d / \beta \end{cases}$$

$$\text{لدينا } d / \beta\gamma - \alpha \text{ ومنه } \begin{cases} d / \beta \\ d / \beta\gamma - \alpha \end{cases} \text{ قاسم مشترك للعددين } \beta \text{ و } \beta\gamma - \alpha \text{ ومنه فهو يقسم القاسم المشترك الأكبر لهما أي } d / d'$$

$$\text{من جهة أخرى لدينا : } d' / \alpha \text{ ومنه } \begin{cases} d' / \beta\gamma \\ d' / \beta\gamma - \alpha \end{cases} \text{ بالطرح نجد : } \begin{cases} d' / \beta \\ d' / \beta\gamma - \alpha \end{cases}$$

$$d' / d \text{ ومنه } d' \text{ قاسم مشترك للعددين } \beta \text{ و } \alpha \text{ ومنه فهو يقسم القاسم المشترك الأكبر لهما أي } d' / d$$

$$PGCD(\alpha; \beta) = PGCD(\beta\gamma - \alpha; \beta) \text{ أي } d = d'$$

ب) استنتاج أنه من أجل عدد طبيعي n ، $PGCD(3n^3 + 4n; n+2) = PGCD(32; n+2)$

$$\text{بوضع : } \gamma = 3n^2 - 6n + 16 \in \mathbb{N}^* \text{ و } \beta = n+2, \alpha = 3n^3 + 4n$$

$$\beta\gamma - \alpha = (n+2)(3n^2 - 6n + 16) - 3n^3 - 4n = 32$$

$$PGCD(3n^3 + 4n; n+2) = PGCD(32; n+2)$$

(4) أ) عين مجموعة القواسم الطبيعية للعدد 32 .

$$\{1; 2; 4; 8; 16; 32\}$$

ب) استنتاج مجموعة قيم العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها العدد $A = \frac{3n^3 + 4n}{n+2}$ طبيعيا .

لدينا من أجل عدد طبيعي n ، $n+2 \neq 0$ عددان طبيعيان مع $n+2 / 3n^3 + 4n$

$PGCD(3n^3 + 4n; n+2) = n+2 / 3n^3 + 4n$ يكفي : $A = \frac{3n^3 + 4n}{n+2}$ حتى يكون العدد

معناه كذلك : $n+2 \in D_{32}^+$ أي $n+2 / 32$ ومنه $PGCD(32; n+2) = n+2$

$n+2$	1	2	4	8	16	32
n	-1	0	2	6	14	30

مرفوض

$$\text{ومنه } \{0; 2; 6; 14; 30\}$$

التمرين الثالث : (4) نقاط

يحتوي كيس على خمس كرات حمراء و ثلاثة كرات بيضاء ، كل الكرات متماثلة ولا تميز بينها باللمس .
نسحب عشوائيا من الكيس ثلاثة كرات في آن واحد .

(1) أحسب احتمال كل من الحدفين التاليين :

"A الحصول على ثلاثة كرات من نفس اللون" ، "B الحصول على كرة بيضاء على الأقل"

$$P(A) = \frac{C_5^3 + C_3^3}{C_8^3} = \frac{11}{56}$$

$$P(B) = \frac{C_3^1 \times C_5^2 + C_3^2 \times C_5^1 + C_3^3}{C_8^3} = \frac{23}{28}$$

(2) نزع من الكيس الكرات البيضاء ونضع مكانها n كرة سوداء حيث $2 \leq n$ ، ثم يسحب لاعب كرتين على التوالي دون إرجاع الكرة المسحوبة الأولى .

إذا سحب اللاعب كرة سوداء يتحصل على 5 نقاط وإذا سحب كرة حمراء يخسر 10 نقاط . ولتكن المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل سحب مجموع النقاط المحصل عليها .

أ) عرف قانون الاحتمال لـ X ، ثم بين أن أمله الرياضي هو

تعيين القيم الممكنة لـ X :

كرتين حمراوين فإنه يخسر 20 نقطة وإذا سحب كرة حمراء وكرة سوداء فإنه يخسر 5 نقاط أما إذا سحب كرتين سوداويين فإنه يربح 10 نقاط ، ومنه $X \in \{-20; -5; 10\}$.

عدد الكرات الإجمالي في الكيس هو $n+5$ ومنه عدد الحالات الممكنة للسحب هو

$$P(X = -20) = \frac{A_5^2}{A_{n+5}^2} = \frac{\frac{5!}{2!}}{\frac{(n+5)!}{(n+3)!}} = \frac{20(n+3)!}{(n+5)!} = \frac{20(n+3)!}{(n+5)(n+4)(n+3)!} = \frac{20}{(n+5)(n+4)}$$

$$P(X = -5) = \frac{\Gamma_2^{1,1} \times A_5^1 \times A_n^1}{A_{n+5}^2} = \frac{2 \times \frac{5!}{4!} \times \frac{n!}{(n-1)!}}{\frac{(n+5)!}{(n+3)!}} = \frac{10n}{(n+5)(n+4)}$$

$$P(X = 10) = \frac{A_n^2}{A_{n+5}^2} = \frac{\frac{n!}{(n-2)!}}{\frac{(n+5)!}{(n+4)!}} = \frac{n(n-1)}{(n+5)(n+4)}$$

$X = X_i$	-20	-5	10
$P(X = X_i)$	$\frac{20}{(n+5)(n+4)}$	$\frac{10n}{(n+5)(n+4)}$	$\frac{n(n-1)}{(n+5)(n+4)}$

$$\begin{cases} E(X) = (-20)\frac{20}{(n+5)(n+4)} + (-5)\frac{10n}{(n+5)(n+4)} + 10 \times \frac{n(n-1)}{(n+5)(n+4)} \\ = \frac{-400 - 50n + 10n(n-1)}{(n+5)(n+4)} = \frac{10n^2 - 60n - 400}{(n+4)(n+5)} \end{cases} \text{ ومنه :}$$

ب) ما هو أصغر عدد ممكن لكرات السوداء حتى تكون اللعبة مربحة .

حتى تكون اللعبة مربحة يكفي : $E(X) > 0$

$$(n+4)(n+5) > 0 \Rightarrow E(X) > 0 \Leftrightarrow \frac{10n^2 - 60n - 400}{(n+4)(n+5)} > 0 \Rightarrow 10n^2 - 60n - 400 > 0$$

يكفي حل المترادفة $10x^2 - 60x - 400 > 0$ نجد $x \in]-\infty; -4] \cup [10; +\infty[$

وبما أن $n \in \mathbb{N}$ فإن $10 < n$ ومنه أصغر عدد ممكن لكرات السوداء حتى تكون اللعبة مربحة هو 11 .

التمرين الرابع : (07 نقاط)

I . نعتبر الدالة العددية g المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ بـ :


. أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$ (1)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty \quad \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 + 2 = 2 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(x + \frac{2}{x} - 2 \frac{\ln x}{x} \right) = +\infty \quad \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \end{cases}$$

2) أدرس اتجاه تغير الدالة g على المجال $[0; +\infty[$ ، ثم شكل جدول تغيراتها .

$$. x \in]0; +\infty[\text{ وإشارتها من إشارة } x^2 - 1 \text{ لأن } g'(x) = \frac{2(x^2 - 1)}{x}$$



جدول التغيرات :

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$	-	+	
$g(x)$	$+\infty$	3	$+\infty$

(3) حدد إشارة $g(x)$ حسب قيم x من المجال $]0; +\infty[$.

الدالة g تقبل قيمة حدية صغيرة هي 3 ومنه $\forall x \in]0; +\infty[, g(x) > 3$.

x	0	$+\infty$
$g(x)$		+

(II) لتكن الدالة العددية f المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ : $f(x) = -x + e - \frac{2 \ln x}{x}$

تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى معلم متعمد و متجانس (C_f) .

(1) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ وفسر النتيجة هندسيا ، ثم أحسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} -x + e - \frac{2}{x} \ln x = +\infty \quad \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \end{cases}$$

ومنه المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مطابقا لحامل محور التراتيب بجوار $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

(2) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0; +\infty[$ ، $f'(x) = \frac{-g(x)}{x^2}$.

$$f'(x) = -1 - \left(\frac{\frac{2}{x} \times x - 2 \ln x}{x^2} \right) = \frac{-x^2 - 2 + 2 \ln x}{x^2} = \frac{-g(x)}{x^2}$$

(3) استنتج إشارة $f'(x)$ ، ثم أدرس اتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها .

$\forall x \in]0; +\infty[, x^2 > 0$ لأنه $-g(x)$ من إشارة $f'(x)$

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	

الدالة f متزايدة تماماً على المجال $[0; +\infty[$

جدول التغيرات :

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	
$f(x)$	$+\infty$	

. (4) أ) بين أن المستقيم (Δ) الذي معادلته $y = -x + e$ مقارب مايل للمنحنى (C_f)

لدينا $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (-x + e)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{2 \ln x}{x} = 0$ بجوار $+\infty$.

. (4) ب) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) .

يكفي دراسة إشارة الفرق $f(x) - (-x + e)$ أي $-\frac{2 \ln x}{x}$

إشارة $-\frac{2 \ln x}{x}$ من إشارة $-2 \ln x$ لأن $x > 0$

x	0	1	$+\infty$
$-2 \ln x$	+		-
الوضعية النسبية	(C_f) فوق	(C_f) تحت	تقاطع

. (5) بين أن المنحنى (C_f) يقبل مماساً وحيداً (T) يوازي المستقيم (Δ) ، ثم جد معادلة له .

يكتفى حل المعادلة $f'(x) = -1$

$$x = e \quad -2 + 2 \ln x = 0 \quad \text{ومنه} \quad f'(x) = -1 \Leftrightarrow \frac{-x^2 - 2 + 2 \ln x}{x^2} = -1$$

ومنه (C_f) يقبل مماساً وحيداً (T) يوازي المستقيم (Δ) حيث : $(T): y = f'(e)(x - e) + f(e)$

$$(T) : y = -x + e - \frac{2}{e}$$


(6) بين أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α حيث $2 < \alpha < 2,1$.

يكفي أن نبين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $2 < \alpha < 2,1$.

الدالة f مستمرة ورتيبة تماماً على المجال $[0; +\infty)$ وبالأخص على المجال $[2; 2,1]$ ولدينا:

$f(2) \approx 0,025 \times (-0,08) \approx -0,002$ ، إذن حسب مير هنة القيم المتوسطة فإن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $2 < \alpha < 2,1$ ومنه (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α حيث $2 < \alpha < 2,1$.

. أرسم كلاً من (Δ) و (T) و (C_f) . (7)



. $x(e - m) = \ln(x^2)$ عدد حلول المعادلة :


المعادلة معرفة من أجل $x \neq 0$ ولدينا :

$$\begin{aligned} x(e - m) = \ln(x^2) &\Leftrightarrow e - m = \frac{2 \ln|x|}{x} \Leftrightarrow m - e = -\frac{2 \ln|x|}{x} \Leftrightarrow -x + e + m - e = -x + e - \frac{2 \ln|x|}{x} \\ &\Leftrightarrow h(x) = -x + m \end{aligned}$$

حيث h هي الدالة المعرفة على \mathbb{R}^* بـ :

$$h(x) = -x + e - \frac{2 \ln x}{x} = f(x) : x > 0$$

ولدينا $h(x) + h(-x) = -x + e - \frac{2 \ln|x|}{x} + x + e + \frac{2 \ln|-x|}{x} = 2e$ لأن $|x| = |-x|$ ومنه منحنى الدالة متناظر بالنسبة إلى النقطة $(0; e)$ ويطابق (C_f) من أجل $x > 0$.



المناقشة مناقشة بيانية وسيطية مائلة وتؤول إلى دراسة عدد نقط تقاطع منحنى الدالة h مع المستقيم (T) والذي يوازي كلا من (Δ) ، (T') و (T'') حيث (T'') : $y = -x + e + \frac{2}{e}$

بالنسبة إلى النقطة \textcircled{a} ومنه :

من أجل $m \in \left[-\infty; e - \frac{2}{e} \right]$ المعادلة تقبل حلاً وحيداً

من أجل $m = e - \frac{2}{e}$ المعادلة تقبل حلاً مضاعفاً وحلاً بسيطاً

من أجل $m \in \left[e - \frac{2}{e}; e \right]$ المعادلة تقبل 3 حلول

من أجل $m = e$ المعادلة تقبل حلين متمايزين

من أجل $m \in \left[e; e + \frac{2}{e} \right]$ المعادلة تقبل 3 حلول

من أجل $m = e + \frac{2}{e}$ المعادلة تقبل حلاً مضاعفاً وحلاً بسيطاً

من أجل $m \in \left[e + \frac{2}{e}; +\infty \right]$ المعادلة تقبل حلاً وحيداً

انتهى تصحيح الموضوع الثاني