



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

الدورة: 2026

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبة: تقني رياضي

المدة: 04 سا و 30 د

اختبار في مادة: الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

(1) (u_n) المتتالية العددية المعرفة على N بـ: $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = 2u_n + 3n + 4$ ،
(أ) احسب u_1 ، u_2

(ب) برهن بالتراجع أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n \geq 3n + 1$ ، ثم استنتج نهاية المتتالية (u_n)
(ج) حدد اتجاه تغير المتتالية (u_n)

(2) (v_n) المتتالية العددية المعرفة على N بـ: $v_n = \ln(u_n + 3n + 7)$

(أ) أثبت أن للمتتالية (v_n) حسابية أساسها $\ln 2$ ، يُطلب حساب حذها الأول.

(ب) اكتب v_n بدلالة n ثم استنتج أن: $u_n = 8 \times 2^n - 3n - 7$

(3) نضع: من أجل كل n من N ، $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

- احسب S_n بدلالة n ثم بين أن: $T_n = 2^{n+4} - \frac{3}{2}n^2 - \frac{17}{2}n - 15$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

يحتوي كيس على 10 كرات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس، منها: كرتان بيضاوان مرقمتان بـ: 0 ، 2 ،
وأربع كرات حمراء مرقمة بـ: 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، وأربع كرات خضراء مرقمة بـ: 1 ، 2 ، 3 ، 4 ،
نسحب عشوائيا من الكيس ثلاث كرات في آن واحد ونعتبر الحوادث:

A : « سحب كرة حمراء على الأقل » ، B : « سحب ثلاث كرات جداء أرقامها معدوم »

C : « سحب ثلاث كرات من نفس اللون » ، D : « سحب ثلاث كرات مجموع أرقامها أكبر من أو يساوي 8 »

(1) (أ) احسب $P(A)$ ، $P(B)$ و $P(C)$ احتمالات الحوادث A ، B و C على الترتيب.

(ب) بين أن: $P(D) = \frac{17}{120}$ وأن: $P(C \cap D) = \frac{1}{60}$

(ج) استنتج حساب احتمال الحادثة E : « سحب ثلاث كرات مجموع أرقامها أصغر من أو يساوي 7 »

(2) X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لثلاث كرات، عدد الكرات التي تحمل رقما فرديا.

- عين قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم احسب أمله الرياضي $E(X)$

التمرين الثالث: (05 نقاط)

- (1) نعتبر المعادلة $(E) \dots 11x - 5y = 7$ ذات المجهولين الصّحيحين x و y
- (أ) بيّن أنّه إذا كانت الثنائية $(x; y)$ حلاً للمعادلة (E) فإنّ $y \equiv 3[11]$ ثم حلّ المعادلة (E)
- (ب) عيّن الثنائيات $(x; y)$ حلول المعادلة (E) التي تحقّق: $|y - x| \leq 5$
- (2) من أجل كلّ عدد طبيعي n ، نضع: $a = 11n + 3$ ، $b = 5n + 2$ و $\text{PGCD}(a; b) = d$
- (أ) ما هي القيم الممكنة للعدد d ؟
- (ب) عيّن الثنائيات $(a; b)$ التي من أجلها يكون $d = 7$
- (3) (أ) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 3^n على 11
- (ب) استنتج أنّه: من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $a^b \equiv 9[11]$ ،
- (ج) عيّن قيمة العدد الطبيعي n حتى يكون $3^{1447} + a^b + a - b - 9 \equiv 0[11]$ و $2015 < n < 2037$
- (4) λ عدد طبيعي يكتب 5623 في نظام التعداد ذي الأساس 7، اكتب λ في نظام التعداد ذي الأساس 6
- التمرين الرابع: (07 نقاط)

- فر الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 1 + (1 - x - x^2)e^{-x}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$
- (1) (أ) احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$
- (ب) بيّن أنّ: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ ثم فسر النتيجة هندسياً.
- (2) (أ) بيّن أنّه: من أجل كلّ x من $\mathbb{R}$ ، $f'(x) = (x^2 - x - 2)e^{-x}$
- (ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.
- (3) أثبت أنّ المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α في المجال $]-1, 7; -1, 6[$
- (4) (أ) عيّن معادلة (T) مماس المنحني (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0
- (ب) احسب $f(-2)$ ثم ارسم (T) و (C_f)
- (ج) عيّن بياناً قيم العدد الحقيقي m حتى يكون للمعادلة: $f(x) = m$ حلان سالبان تماماً.
- (5) (أ) تحقّق أنّ الدالة $H: x \mapsto (x^2 + 3x + 2)e^{-x}$ أصلية للدالة $h: x \mapsto (1 - x - x^2)e^{-x}$ على $\mathbb{R}$
- (ب) $\mathcal{A}(\alpha)$ مساحة الحيز المستوي المحدّد بالمنحني (C_f) والمستقيمت التي معادلاتها:
- $$\vec{x} = 0 \text{ و } x = \alpha, y = 0$$
- احسب $\mathcal{A}(\alpha)$ ثم بيّن أنّ: $\mathcal{A}(\alpha) = \frac{4 + \alpha^3}{1 - \alpha - \alpha^2}$ ، $\mathcal{A}(\alpha)$ مقبرة بوحدة المساحة.

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

(1) (u_n) المتتالية العددية المعرفة على N بـ: $u_0=1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = u_n - 3 \times 2^n$ ،
- احسب u_1 ، u_2 ، ثم حدّد اتجاه تغيّر المتتالية (u_n)

(2) (v_n) المتتالية العددية المعرفة على N بـ: $v_n = \frac{u_n}{2^n} + 3$

(أ) أثبت أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ ، يُطلب تعيين حدّها الأول.

(ب) اكتب v_n بدلالة n ثمّ بيّن أنّ: $u_n = 4 - 3 \times 2^n$

(3) نضع: من أجل كل n من N ، $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

(أ) احسب S_n بدلالة n ثمّ استنتج نهاية S_n

(ب) بيّن أنّه: من أجل كل n من N ، $T_n = 4n + 7 - 6 \times 2^n$

(ج) احسب بدلالة n المجموع L_n حيث: $L_n = T_0 + T_1 + \dots + T_n$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

يحتوي كيس على 11 كرة متماثلة ولا نفرّق بينها باللمس، منها:

كرتان بيضاوان، خمس كرات حمراء، ثلاث كرات خضراء وكرّة واحدة سوداء.

(1) نسحب عشوائيا من الكيس ثلاث كرات على التوالي دون إرجاع ونعتبر الحوادث:

A : « سحب ثلاث كرات من نفس اللون » ، B : « سحب كرة واحدة بيضاء فقط »

C : « سحب كرة حمراء على الأكثر » ، D : « سحب كرتين حمراوين على الأقل »

(أ) احسب $P(A)$ ، $P(B)$ ، $P(C)$ و $P(D)$ احتمالات الحوادث A ، B ، C و D على الترتيب.

(ب) بيّن أنّ: $P(A \cap D) = \frac{2}{33}$ ثمّ استنتج حساب $P(A \cup D)$

(2) نفرض أنّ عدد الكرات السوداء في الكيس هو n حيث: $n \geq 2$ ونسحب منه كرتين على التوالي مع الإرجاع.

- عيّن قيمة n حتى يكون احتمال سحب كرتين سوداوين يساوي $\frac{1}{4}$

التمرين الثالث: (05 نقاط)

(1) (أ) عيّن باقي القسمة الإقليدية للعدد 1447 على 7 وباقي القسمة الإقليدية للعدد 2687 على 13

(ب) بزر أنّ العدد 1447 أولي ثمّ عيّن القواسم الطبيعية للعدد 2894

(ج) جد الثنائيات $(x; y)$ من الأعداد الطبيعية التي تحقّق: $x(x+y) = 2894$

(2) من أجل كل عدد طبيعي n ، نضع: $a = 7n + 5$ ، $b = 13n + 9$ و $PGCD(a; b) = d$

- عيّن القيم الممكنة للعدد d ثمّ حدّد قيم n التي من أجلها يكون $d = 2$

(3) من أجل كل عدد طبيعي n ، نضع: $A = 14n^2 + 17n + 5$ و $B = 26n^2 + 31n + 9$

(أ) بين أن العدد $(2n+1)$ يقسم كلا من العددين A و B

(ب) استنتج بدلالة n وحسب قيم n القاسم المشترك الأكبر للعددين A و B

(4) من أجل $d = 1$ ، احسب بدلالة n المضاعف المشترك الأصغر للعددين A و B

التمرين الرابع: (07 نقاط)

ف الدالة المعرفة على $]0; e[\cup]e; +\infty[$ بـ: $f(x) = x + \frac{1}{x - x \ln x}$ و (c_r) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

(1) (أ) احسب النهايات: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow e} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، فتر النتائج هندسياً.

(ب) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

(2) (أ) بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة: $y = x$ مقارب مائل لـ (c_r)

(ب) ادرس الوضع النسبي لـ (c_r) و (Δ)

(3) (أ) بين أنه: من أجل كل x من $]0; e[\cup]e; +\infty[$ ، $f'(x) = 1 + \frac{\ln x}{(x - x \ln x)^2}$

x	0	α	e	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+	+

(ب) نقبل أن إشارة $f'(x)$ موضحة في الجدول المقابل

- تحقق أن $0,4 < \alpha < 0,5$

(ج) شكّل جدول تغيرات الدالة f

(4) (أ) بين أن (c_r) يقبل مماساً (T) يوازي (Δ) ، يُطلب تعيين معادلة له.

(ب) أثبت أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً β في المجال $]3; 3,1[$

(5) (أ) ارسم (Δ) ، (T) و (c_r) (ناخذ: $f(\alpha) \simeq 1,7$)

(ب) ناقش بياناً وحسب قيم العدد الحقيقي m عدد حلول المعادلة: $m(x - x \ln x) = 1$

(6) h الدالة المعرفة على $]0; e[$ بـ: $h(x) = \ln(1 - \ln x)$

- احسب $h'(x)$ ثم استنتج حساب $\mathcal{A}$ مساحة الحيز المستوي المحدّد بـ (c_r) والمستقيمت التي معادلاتها:

$$y = x, \quad x = \frac{1}{e} \quad \text{و} \quad x = 1$$

انتهى الموضوع الثاني